

FORTECID® POLVERE

Insetticida pronto all'uso in microgranuli
CATEGORIA DI UTILIZZATORI: NON PROFESSIONALE
AREA DI UTILIZZO: IN AMBIENTI CHIUSI

FORTECID® POLVERE

UFI: PDR7-408G-A00A-U1DA

Composizione

100 g di prodotto contengono:
Permetrina (CAS: 52645-53-1) pura 0,50 g
Piperonil butossido (CAS: 51-03-6) puro 0,05 g
Coformulanti q.b. a 100 g

Indicazioni di pericolo

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH208 Contiene Permetrina.

Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi in conformità alle normative nazionali.

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)

Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2022/00832/MRP

Titolare dell'autorizzazione: BLEU LINE S.r.l.
Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - 47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 754430

Officina di produzione: FERBI S.r.l.

Viale 1° Maggio - C.da Ripoli
64023 Mosciano S. Angelo (TE)

Distribuito da: FORMEVET S.r.l.
Via Savona, 97 - 20144 Milano

Tel. 02 4345891

ATTENZIONE

Contenuto netto:
Lotto n./del: vedi timbro
Validità: 2 anni

500 g; 1000 g €

Il biocida non deve essere applicato in aree in cui sono presenti, al momento del trattamento, alimenti per il consumo umano. Evitare l'esposizione di animali durante il trattamento. Non utilizzare il prodotto in agricoltura.

ORGANISMI TARGET - Blatte (*Periplaneta americana*), zecche (*Ixodes ricinus*), formiche (*Lasius niger*), adulte.

Flacone: Plastica HDPE 2 - **Tappo e sottappo:** Plastica PP 5
Smaltire in punti di raccolta per rifiuti pericolosi.
Verifica le disposizioni del tuo Comune.

B0324



8 0336381273326

Formevet®
ONE HEALTH FOR ALL

FORTECID® POLVERE

Z ECCHE B LATTE & F ORMICHE

INSETTICIDA PRONTO ALL'USO IN MICROGRANULI.

CONTRO BLATTE, Z ECCHE E FORMICHE.

PER USO NON PROFESSIONALE

ISTRUZIONI PER L'USO E DOSAGGIO

Il prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti chiusi, in aree soggette a restrizione "rigorosamente SENZA pulizia a umido". Da utilizzare su superfici porose e non porose. Metodo di applicazione: a diffusione.

Trattamento su blatte: applicare sulle superfici interne (su una striscia perimetrale), anche su crepe e fessure, contro la blatta americana (*Periplaneta americana*) spargendo il prodotto direttamente dalla confezione o tramite il diffusore in modo uniforme. Dosaggio: 10 g prodotto/m². Frequenza di applicazione: una volta al mese. Il prodotto ha un effetto residuo di 3 settimane.

Trattamento su zecche: applicazioni perimetrali in ambienti interni contro le zecche (*Ixodes ricinus*) spargendo il prodotto direttamente dalla confezione o tramite il diffusore in modo uniforme sulle superfici nelle parti perimetrali della stanza. Dosaggio: 12 g prodotto/m². Frequenza di applicazione: una volta al mese. Il prodotto ha un effetto residuo di 3 settimane. Il prodotto non deve essere utilizzato in presenza di persone o animali (animali domestici). Le persone e gli animali domestici possono rientrare nell'area sottoposta a trattamento dopo 24 ore dall'applicazione del prodotto. I locali/la stanza sottoposti a trattamento non devono essere resi accessibili agli animali domestici.

Trattamento su formiche: applicazioni nelle parti perimetrali su crepe e fessure contro le formiche nere (*Lasius niger*) spargendo il prodotto direttamente dalla confezione o tramite il diffusore in modo uniforme in particolare nei punti in cui le formiche entrano nell'edificio. Dosaggio: 10 g prodotto/m². Frequenza di applicazione: una volta al mese. Il prodotto ha un effetto residuo di 3 settimane.

In tutte le tipologie di trattamento:

Non collocare alimenti o mangimi nelle aree in cui il prodotto è o sarà applicato. Rimuovere (pulire) il prodotto e gli insetti morti quando non si rileva la presenza di insetti vivi.

MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

NON eseguire pulizie a umido. Eseguire una pulizia a secco delle superfici trattate e della parte di pavimento adiacente con aspirapolvere o scopa o utilizzando carta umida. Evitare che il prodotto raggiunga alimenti o mangimi, bevande, contenitori destinati a contenitori o superfici ed utensili che possano entrare in contatto. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavare accuratamente con acqua e sapone.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO SICURO DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO

I contenitori vuoti, il prodotto inutilizzato e altri rifiuti generati durante il trattamento e la pulizia (ad es. carta umida, aspirapolvere o i rifiuti della scopa) sono considerati rifiuti pericolosi. Raccogliere tutto il materiale di risulta e riporlo in contenitori appositamente chiusi e contrassegnati. Non gettare su pavimenti sterzati, nei corsi d'acqua, nel lavandino o nello scarico. Smaltire il contenuto/il recipiente in conformità alle normative locali.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E DURATA DI CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO IN CONDIZIONI NORMALI DI STOCCAGGIO

In confezioni mantenute integre ed in normali condizioni di temperatura, il biocida mantiene inalterate le sue caratteristiche per almeno 2 anni, se conservato nella propria confezione iniziale per la messa in commercio.